

Legenda

- Acque salate e/o salmastre
- Aggruppamenti a cannuccia palustre e giunco marittimo (*Phragmites communis*/Juncion maritimi)
- Aggruppamenti a giunco marittimo e liscia marittima (Juncion maritimi/Phragmites communis)
- Aggruppamenti a liscia marittima (*Phragmites communis*)
- Aree sottoposte a forte pressione antropica (urbane, ricreative, ecc.)
- Canneti a cannuccia palustre (*Phragmites vulgaris*)
- Cenosi di depressioni retrodunali debolmente alofite (*Eriophorum-Schoenetum nigricantis*)
- Cenosi erbacee delle dune interne (*Ammophila* cfr. *Psammo-Koelerion*)
- Cenosi erbacee di interferenza con elementi di praterie aride e prati da sfalcio (*Festuco-Brometea*/Molinio-Arrhenatheretea)
- Cenosi pioniere delle spiagge (*Salsola kali-Cakiletum maritima*)
- Cenosi pioniere di dune embrionali (*Sporobolus arenarii-Agropyretum juncei*)
- Cenosi ruderali arboreo-arbustive (*Prunetalia*)
- Cenosi ruderali erbacee (*Artemisietea*, *Stellarietea*, *Agropyretea*, *Plantaginetea*)
- Colture e piantumazioni
- Facies ad alofite succulente annuali su terreni di riporto
- Facies di interferenza fra cenosi di prati aridi e cenosi ruderali (*Sedo-Scleranthetea*/Festuco-Brometea/Stellarietea)
- Filari di alberi
- Formazioni arbustive con ontano nero (*Prunetalia*)
- Giuncheti e praterie umide salate e salmastre (*Juncion maritimi*)
- Giuncheti e praterie umide salate e salmastre (*Juncion maritimi*) con predominanza di *Arthrocnemum*
- Giuncheti e praterie umide salate e salmastre (*Juncion maritimi*) con predominanza di *Spartina juncea*
- Leccete con pino nero (*Quercion ilicis*)
- Leccete pure (*Quercion ilicis*)
- Mantelli termofili (*Cytision sessilifolii*)
- Mosaico fra cenosi erbacee delle dune interne e mantelli termofili (*Ammophila* cfr. *Psammo-Koelerion* / *Cytision sessilifolii*)
- Mosaico fra praterie aride a lino delle fate veneto e mantelli termofili (*Satureion subspicatae*/Cytision sessilifolii)
- Mosaico fra praterie umide e mantelli termofili (*Molinion caeruleae*/Cytision sessilifolii)
- Mosaico fra praterie umide e praterie aride a lino delle fate veneto (*Molinion caeruleae*/Satureion subspicatae)
- Mosaico fra siepi termofili e cenosi prative di interferenza (*Prunetalia*/Festuco-Brometea/Molinio-Arrhenatheretea)
- Mosaico fra siepi termofili e praterie aride a lino delle fate veneto (*Prunetalia*/Satureion subspicatae)
- Pinete artificiali a pino domestico (*Pinus pinea*)
- Popolamenti a falasco (*Mariscoetum serrati*)
- Popolamenti a sparto marittimo (*Spartinetum maritima*)
- Popolamenti erbacei ad elevato dinamismo
- Praterie aride a lino delle fate veneto (*Satureion subspicatae*)
- Praterie umide a molinia (*Molinion caeruleae*)
- Prati pingui da sfalcio (*Arrhenatherion elatioris*)
- Sabbie prive di colonizzazione vegetale
- Siepi termofili (*Prunetalia*)
- Vegetazione delle dune embrionali, mobili e semisfisse (*Ammophila arenaria*)

Carta della vegetazione

Buccheri M., Gallizia Vuerich L., Martini F., Ortolan I., Sergio P.

